

ファムシクロビル錠 250mg [KMP]

<旧販売名>

ファムシクロビル錠 250mg [共創未来]

保管袋

再発性の単純疱疹

(口唇ヘルペス・性器ヘルペス)

に対する治療を受けられる方へ

- ① 再発の初期症状を感じたら速やかに(6時間以内に)お薬(4錠)を飲んでください。
- ② 12時間後を目安に2回目のお薬(4錠)を飲んでください。

詳細は裏面をご参照ください

- ・保管袋のチャックをしっかりと閉め、直射日光を避けて室温(1~30℃)で保管してください。
- ・使用期限を過ぎたお薬は服用しないでください。

使用期限

 共創未来ファーマ株式会社

注意事項

- 以下のような再発の初期症状を感じた場合、再発の初期症状出現後速やかに(6時間以内)お薬(4錠)を服用してください。
 - 痛み(チクチク・ヒリヒリなど)
※ただし性器ヘルペスの排尿時の痛みは含まない。
 - むずむずするような違和感
 - かゆみ
 - 腰の痛みや違和感(性器ヘルペスの場合)
- 注)上記の例は、再発時に一般的に認められる症状です。
- 医師の指導に従いお薬を服用してください。
2回服用するよう指導された場合、2回目の服用は、1回目の服用から12時間程度あけてから服用するようにしてください。12時間後が就寝中となる場合は、6~18時間後の範囲で、就寝前または起床後に服用してください。
 - 妊娠または妊娠している可能性がある場合、授乳中の場合は、お薬を服用せずに処方医師に相談してください。
 - 服用中、服用後に気になる症状があらわれた場合や異常(症状の増悪を含む)を感じた場合は、放置せず、すぐに医師・薬剤師に相談してください。また、再発の初期症状出現後6時間以内にお薬を服用できなかった場合で、治療を希望される方は、医療機関を受診してください。

