




標準製剤との対比表

	後発品		標準製剤		
販売名	アリピプラゾール錠 6mg 「オーハラ」		エビリファイ錠 6mg		
販売元 (製造販売元)	共創未来ファーマ株式会社 (大原薬品工業株式会社)				
成分・含量	1錠中アリピプラゾール 6mg を含有				
薬効分類	抗精神病薬				
薬 価	24.10 円/錠		120.00 円/錠		
薬 価 差	95.90 円/錠				
効能・効果	1. 統合失調症				
	標準製剤のみが有する効能効果 2. 双極性障害における躁症状の改善 3. うつ病・うつ状態（既存治療で十分な効果が認められない場合に限る） 4. 小児期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性				
用法・用量	1. 通常、成人にはアリピプラゾールとして1日6～12mgを開始用量、1日6～24mgを維持用量とし、1回又は2回に分けて経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減するが、1日量は30mgを超えないこと。				
	標準製剤のみが有する用法用量 2. 通常、成人にはアリピプラゾールとして12～24mgを1日1回経口投与する。なお、開始用量は24mgとし、年齢、症状により適宜増減するが、1日量は30mgを超えないこと。 3. 通常、成人にはアリピプラゾールとして3mgを1日1回経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減するが、増量幅は1日量として3mgとし、1日量は15mgを超えないこと。 4. 通常、アリピプラゾールとして1日1mgを開始用量、1日1～15mgを維持用量とし、1日1回経口投与する。なお、症状により適宜増減するが、増量幅は1日量として最大3mgとし、1日量は15mgを超えないこと。				
添加物	D-マンニトール、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、ステアリン酸マグネシウム		乳糖水和物、トウモロコシデンプン、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウム		
製 剤	販売名	外 観(直径, 厚さ, 重量)		性 状	識別コード
	アリピプラゾール錠 6mg 「オーハラ」	 7.0mm 2.6mm 125mg		白色・素錠	アリピプラゾール 6 オーハラ
標準製剤	6mg	7mm 2.7mm 約135mg		白色の素錠	
標準製剤との 同等性	溶出試験(試験液: pH5.0/50rpm)		生物学的同等性試験(健康成人男性, 絶食時)		
	 <p>「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン」の溶出試験の項に準じ試験を行った結果、アリピプラゾール錠 6mg 「オーハラ」は規定されたすべての溶出試験条件において溶出率の判定基準に適合し、アリピプラゾール錠 6mg 「オーハラ」の溶出挙動は標準製剤(錠剤, 6mg)と類似していると判定された。</p>		 <p>アリピプラゾール錠 6mg 「オーハラ」と標準製剤を、クロスオーバー法によりそれぞれ1錠(アリピプラゾールとして6mg)健康成人男子に絶食単回経口投与して血漿中未変化体濃度を測定した。得られた薬物動態パラメータ(AUC, Cmax)について90%信頼区間法にて統計解析を行った結果、log(0.80)～log(1.25)の範囲内であり、両剤の生物学的同等性が確認された。</p>		
	備考				
連絡先					