


ドネペジル塩酸塩錠/OD錠を 服用される 患者さんおよびご家族、介護者の方へ

このお薬は、アルツハイマー型認知症およびレビー小体型認知症でみられる認知機能障害の症状の進行を遅らせ、認知機能の変動を少なくするお薬です。

飲み方と気を付けていただきたいこと

- 主治医、薬剤師の指示を守って、1日1回飲んでください。
- お薬はPTPシートから取り出して飲んでください。
- OD錠は水なしで、舌の上で唾液を含ませ舌で軽く押しつぶすようにして、唾液と一緒に飲むこともできます。寝たままの状態では、水なしで飲まないでください。
- このお薬は3mg錠から開始し、1～2週間後に5mg錠になります。高度のアルツハイマー型認知症の方およびレビー小体型認知症の方は、5mg錠で4週間以上経過後、10mg錠になります。なお、10mgに増量後に、症状により高度アルツハイマー型認知症の場合は適宜減量を、レビー小体型認知症の場合は、5mgまで減量することがあります。



※高度のアルツハイマー型認知症の方およびレビー小体型認知症の方

- 飲み忘れても、次の日に2日分を一度に服用しないでください。
- 誤って多く飲んでしまった場合は、直ちに主治医または薬剤師に連絡してください。
- 主治医の指示なしに、このお薬をご自身の判断で中止しないでください。
- 飲む回数や量を間違わないように、お薬はできるだけご家族や介護者が管理してください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。

このお薬の副作用について

意識障害、めまい、眠気などがあらわれることがありますので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作は行わないようにしてください。



○このお薬を飲んで、普段と異なる以下のような症状が続く場合は、主治医または薬剤師に相談してください。

- 軽い吐き気、食欲不振、便が軟らかい
- パーキンソン症状（筋肉のこわばり、手足のふるえ、表情が乏しくなる、動作がゆっくりになる、小刻みで歩く、転倒しやすいなど）が悪化する

その他にも気になることがございましたら、主治医または薬剤師に相談してください。

医療機関名・連絡先: