

デュタステリドカプセルAV「トローワ」を服用されている患者さまへ

この薬について

- 前立腺肥大症の治療薬です。
- カプセルを、かんだり、開けたりせずに飲んでください。
- PSA（前立腺特異抗原）検査を受けるときは、下の服用カードを担当の先生に提示し、この薬を服用中であることを必ず伝えてください。

この薬は、前立腺がんの腫瘍マーカー（前立腺がんの有無の目安）であるPSA値に影響を与えますが、その影響を考慮することにより、この薬を服用中であっても、PSA検査を行うことが可能です。

副作用について

- 勃起不全や性欲（リビドー）減退、乳房障害（女性化乳房、乳頭痛、乳房痛、乳房不快感）などが起こることがあります。
- 肝機能検査値〔AST(GOT)、ALT(GPT)、ビリルビン〕の上昇等を伴う肝機能障害や黄疸があらわれることがあります。

これらの症状があらわれたり、いつもと違うと感じたら、医師または薬剤師に連絡してください。

✂-----（枠内に記入して、切り取って使用してください）-----✂

デュタステリドカプセルAV「トローワ」服用カード

～必ず常に本カードを携帯してください～

患者さんへ 医療機関を受診される際、または健康診断などで
PSA検査を受けるときは、必ずこのカードをご提示ください。

お名前 :

服用を開始した日: 年 月 日

服用開始前のPSA値: ng/ml

取扱いについて

- 高温多湿の場所や光が直接当たる場所での保管は避けてください。
- 服用する直前にシートから取り出して飲んでください。
- 女性や小児はカプセルから漏れた薬剤に触れないでください。漏れた薬剤に触れた場合には、ただちに石鹸と水で洗ってください。

他の病院で受診する場合や、薬局などで薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいいることを医師または薬剤師に伝えてください。

医師または薬剤師の連絡先

製造販売元

東和薬品株式会社

販売元

 共創未来ファーマ株式会社

dutCAP-KS①
2020年5月作成



(枠内に記入して、切り取って使用してください)



デュタステリドカプセルAV「トーフ」服用カード

～必ず常に本カードを携帯してください～

本カードを提示された医療関係者の方へ

患者さんは、前立腺肥大症治療薬のデュタステリドカプセルAV「トーフ」を服用しています。

この薬は、服用開始6ヵ月後よりPSA値を約50%減少させる作用がありますので、PSA値を評価される際は、その点を考慮していただきますようお願いいたします。

製造販売元

東和薬品株式会社

販売元

 共創未来ファーマ株式会社

dutCAP-KS①
2020年5月作成