

エピナスチン塩酸塩錠 10mg 「YD」 の 溶出試験について

溶出挙動に関する資料

共創未来ファーマ株式会社

(1) 規格及び試験方法

エピナスチン塩酸塩錠 10mg「YD」は、日本薬局方外医薬品規格第 3 部に定められたエピナスチン塩酸塩錠の溶出規格に適合していることが確認されている。

(2) 生物学的同等性試験

エピナスチン塩酸塩錠 10mg「YD」について、「医療用医薬品の品質に係る再評価の実施について（医薬発第 634 号、平成 10 年 7 月 15 日）」に従い溶出試験を行った結果、判定基準に適合した。


<試験方法>

装置 : 日本薬局方一般試験法溶出試験第 2 法（パドル法）
試験液量 : 900mL
温度 : 37±0.5℃
回転数 : 50 回転
試験液 : pH1.2＝日本薬局方崩壊試験の第 1 液
pH4.0＝酢酸・酢酸ナトリウム緩衝液（0.05mol/L）
pH6.8＝日本薬局方試薬・試液のリン酸塩緩衝液（1→2）
水＝日本薬局方精製水

判定基準 : 【pH1.2、4.0、6.8、水】


標準製剤が 15 分以内に平均 85%以上溶出する場合、試験製剤は 15 分以内に平均 85%以上溶出するか、又は 15 分において、試験製剤の平均溶出率は標準製剤の平均溶出率±15%の範囲にある。

<試験結果>



製造販売元

株式会社 陽進堂
 富山県富山市婦中町萩島3697番地8号

販売元

共創未来ファーマ株式会社
 東京都品川区広町 1-4-4

A000000465