

ファムシクロビル錠250mg「KMP」 を服用される患者さまへ

このお薬は、たんじゅんほうしん単純疱疹とたいじょうほうしん帯状疱疹の原因となるウイルスの増殖を抑えます。効果があらわれるまでに少し日数がかかることがあります。ご自身の判断で飲む量を加減したり、中止したりしないで、医師の指示通りに服用してください。



服用前の注意

透析を受けている方、腎臓が悪いと言われたことのある方は、お薬の量の調節が必要な場合もありますので必ず医師または薬剤師にお伝えください。

服用中の注意

服用中に下記のような症状があらわれた場合は、すぐに受診してください。

- 考えがまとまらない、判断力が低下する
- 現実には存在しないものが見えたり、ない音が聞こえたりする
- 意識がなくなる
- 高熱を伴い、目の充血や口のただれが出てきた
- (患部とは別に)広範囲の赤い斑点や発疹が出てきた
- 尿量が減った、または尿がほとんど出ない
- むくみが出た
- 赤褐色の尿が出た
- 手足・肩・腰などの筋肉の痛み
- 脱力感(手足に力が入らない)
- 蕁麻疹が出た、急に血圧が低下した、息苦しい

その他、異常を感じた場合は、放置せず医師または薬剤師にご相談ください。

日常生活の注意

- **服用中は、普段より多めに水分をとるよう**に心がけてください
腎臓からお薬が排出されやすくなります。
※水分の摂取を制限されている患者さまは、医師の指示に従ってください。
- **できるだけ安静に**してください
十分な睡眠と栄養をとり、安静を心がけることが回復への近道です。
- **水ぶくれやかさぶたにはなるべく触れない**ように気をつけてください
水ぶくれが破れると、細菌による感染が起こりやすくなります。
患部を触った後は石鹸で手をきれいに洗ってください。
- **带状疱疹の患者さまは、患部を冷やさない**ようにしてください
冷えると痛みがひどくなりますので、できるだけ温めて血行をよくしてください。
ただし、使い捨てカイロや温シップ薬を使用する場合は、やけどやかぶれに注意してください。
- **带状疱疹の患者さまは、症状が出ている間は乳幼児・小児には近づかない**ようにしてください
水ぼうそうにかかったことのない乳幼児・小児に、水ぼうそうを発症させる可能性があります。
- **単純疱疹の患者さまは、症状が出ている間は他者との接触を控えて**ください
単純疱疹のウイルスは接触により感染します。
- **自動車の運転等、危険を伴う機械の操作**を行う場合には十分に注意してください
意識障害(気を失う、もうろう状態)等の副作用が報告されています。

ほかにも気になることや、わからないことがある場合は
医師または薬剤師に相談してください。

医師または薬剤師の連絡先