

ガランタミン OD 錠 4mg 「トーワ」
 ガランタミン OD 錠 8mg 「トーワ」
 ガランタミン OD 錠 12mg 「トーワ」

【この薬は？】

販売名	ガランタミン OD 錠 4mg 「トーワ」 GALANTAMINE OD TABLETS 4mg “TOWA”	ガランタミン OD 錠 8mg 「トーワ」 GALANTAMINE OD TABLETS 8mg “TOWA”	ガランタミン OD 錠 12mg 「トーワ」 GALANTAMINE OD TABLETS 12mg “TOWA”
一般名	ガランタミン臭化水素酸塩 Galantamine Hydrobromide		
含有量 (1錠中)	5.126mg (ガランタミンとして 4mg)	10.253mg (ガランタミンとして 8mg)	15.379mg (ガランタミンとして 12mg)

患者向医薬品ガイドについて

患者向医薬品ガイドは、患者の皆様や家族の方などに、医療用医薬品の正しい理解と、重大な副作用の早期発見などに役立てていただくために作成したものです。

したがって、この医薬品を使用するときに特に知っていただきたいことを、医療関係者向けに作成されている添付文書を基に、わかりやすく記載しています。

医薬品の使用による重大な副作用と考えられる場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

ご不明な点などありましたら、末尾に記載の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

さらに詳しい情報として、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」
<http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に添付文書情報が掲載されています。

【この薬の効果は？】

- ・この薬は、アルツハイマー型認知症治療剤と呼ばれるグループに属する薬です。
- ・この薬は、アセチルコリン（脳内の神経伝達物質）を分解する酵素の働きを抑えてその減少を防いだり、アセチルコリンの作用を増強したりして、認知症症状の進行を遅らせます。
- ・次の目的で処方されます。

軽度及び中等度のアルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制

- ・この薬は、体調がよくなったと自己判断して使用を中止したり、量を加減したりすると、病気が悪化することがあります。指示どおりに飲み続けることが重要です。

【この薬を使う前に、確認すべきことは？】

- 次の人は、この薬を使用することはできません。
 - ・過去にガランタミン OD 錠に含まれる成分で過敏な反応を経験したことがある人
- 次の人は、慎重に使う必要があります。使い始める前に医師または薬剤師に教えてください。
 - ・洞不全症候群または伝導障害などの心臓に障害のある人
 - ・過去に消化性潰瘍があった人、非ステロイド性消炎鎮痛剤を使用している人、消化管閉塞のある人、消化管手術直後の人
 - ・下部尿路閉塞のある人、膀胱手術直後の人
 - ・てんかんなどのけいれんをおこす疾患にかかっている人、または過去におこしたことがある人
 - ・過去に気管支喘息や閉塞性肺疾患があった人
 - ・錐体外路障害（パーキンソン病、パーキンソン症候群など）のある人
 - ・肝臓に障害のある人
 - ・腎臓に障害のある人
- この薬には併用を注意すべき薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。

【この薬の使い方は？】

●使用量および回数

飲む量は、あなたの症状などにあわせて、医師が決めます。
成人の飲む量および回数は、次のとおりです。

[通常]

	飲み始めから 4 週間	4 週間後～
1 日量	8mg	16mg
飲む回数	1 日 2 回食後	
最高量	1 日量として 24mg	

- ・増量が必要な場合、4 週間以上同じ用量を飲んだ後、増量されます。

[肝臓に障害がある場合]

	飲み始めから1週間以上	1週間後～
1日量	4mg	8mg
飲む回数	1日1回食後	1日2回食後
最高量	1日量として16mg	

・増量が必要な場合、4週間以上同じ用量を飲んだ後、増量されます。

●どのように飲むか？

舌の上のにせ唾液で湿らせて舌で軽くつぶし、水なしで飲むことができます。また、コップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲むこともできます。寝たままの状態では、水なしで飲まないようにしてください。

●飲み忘れた場合の対応

決して2回分を一度に飲まないでください。

気がついた時に、1回分を飲んでください。ただし、次に飲む時間が近い場合は1回とばして、次の時間に1回分を飲んでください。

●多く使用した時（過量使用時）の対応

筋力低下、筋肉のけいれん、重度の吐き気、嘔吐（おうと）、消化管けいれん、よだれがでる、涙が止まりにくい、排尿、排便、発汗、徐脈、低血圧、虚脱（冷や汗、力が抜けるなど）、けいれんなどがあらわれる可能性があります。これらの症状があらわれた場合は、使用を中止し、ただちに医師に連絡してください。

【この薬の使用中に気をつけなければならないことは？】

- ・この薬の使用中に、徐脈、心ブロック（めまい、気を失う）、QT延長（動悸、気を失う）などがあらわれることがあります。特に心臓病（心筋梗塞、弁膜症、心筋症など）の人や電解質異常（低カリウム血症など）のある人では注意してください。異常を感じたら、ただちに受診してください。
- ・この薬の使用により、めまい、眠気がおこることがあります。また、アルツハイマー型認知症では運転能力や機械操作能力が徐々に低下することがあるので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作に注意してください。特に、使用し始めから数週間は注意してください。
- ・この薬の使用で、体重が減少することがあります。また、アルツハイマー型認知症でも体重が減少することがあるので、体重が減った場合は、医師に相談してください。
- ・妊婦または妊娠している可能性がある人は医師に相談してください。
- ・授乳中の方は授乳を避けてください。
- ・他の医師を受診する場合や、薬局などで他の薬を購入する場合は、必ずこの薬を飲んでいることを医師または薬剤師に伝えてください。

副作用は？

特にご注意いただきたい重大な副作用と、それぞれの主な自覚症状を記載しました。副作用であれば、それぞれの重大な副作用ごとに記載した主な自覚症状のうち、いくつかの症状が同じような時期にあらわれることが一般的です。このような場合には、ただちに医師または薬剤師に相談してください。

重大な副作用	主な自覚症状
失神 しっしん	気を失う
徐脈 じよみやく	めまい、意識の低下、考えがまとまらない、息切れ、脈がとぶ、脈が遅くなる、判断力の低下
心ブロック しんブロック	めまい、気を失う
QT 延長（心電図の異常） キューティーえんちよう（しんでんずのいじよう）	動悸、めまい、気を失う
急性汎発性発疹性膿疱症 きゅうせいはんぱつせいほっしんせいのうほうしょう	からだがだるい、高熱、皮膚の広い範囲が赤くなる、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、食欲不振
肝炎 かんえん	からだがだるい、白目が黄色くなる、吐き気、嘔吐、食欲不振、皮膚が黄色くなる
横紋筋融解症 おうもんきんゆうかいしょう	脱力感、手のしびれ、手足のこわばり、足のしびれ、筋肉の痛み、赤褐色尿

以上の自覚症状を、副作用のあらわれる部位別に並び替えると次のとおりです。これらの症状に気づいたら、重大な副作用ごとの表をご覧ください。

部位	自覚症状
全身	からだがだるい、高熱、脱力感
頭部	めまい、意識の低下、考えがまとまらない
眼	白目が黄色くなる
口や喉	吐き気、嘔吐
胸部	息切れ、動悸、吐き気
腹部	食欲不振、吐き気
手・足	脈がとぶ、脈が遅くなる、手のしびれ、手足のこわばり、足のしびれ
皮膚	皮膚の広い範囲が赤くなる、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、皮膚が黄色くなる
筋肉	筋肉の痛み
尿	赤褐色尿
その他	気を失う、判断力の低下

【この薬の形は？】

販売名	ガランタミン OD 錠 4mg 「トーワ」	ガランタミン OD 錠 8mg 「トーワ」	ガランタミン OD 錠 12mg 「トーワ」
PTP シート	表 	表 	表 
	裏 	裏 	裏 
形状	口腔内崩壊錠 	口腔内崩壊錠 (割線入り) 	口腔内崩壊錠 
直径	6.0mm	7.0mm	8.0mm
厚さ	3.0mm	3.4mm	3.5mm
重さ	90mg	140mg	180mg
色	微黄色	微赤色	白色
本体 表示	表	ガランタ 8	12 ガランタミン OD トーワ
	裏	4 ガランタミン OD トーワ	

【この薬に含まれているのは？】

販売名	ガランタミン OD 錠 4mg 「トーワ」	ガランタミン OD 錠 8mg 「トーワ」	ガランタミン OD 錠 12mg 「トーワ」
有効成分	ガランタミン臭化水素酸塩（ガランタミン）		
添加物	D-マンニトール、ヒドロキシプロピルセルロース、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、タルク、軽質無水ケイ酸、黄色三二酸化鉄、アスパルテーム（L-フェニルアラニン化合物）、ステアリン酸マグネシウム、その他3成分	D-マンニトール、ヒドロキシプロピルセルロース、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、タルク、軽質無水ケイ酸、三二酸化鉄、アスパルテーム（L-フェニルアラニン化合物）、ステアリン酸マグネシウム、その他3成分	D-マンニトール、ヒドロキシプロピルセルロース、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、タルク、軽質無水ケイ酸、アスパルテーム（L-フェニルアラニン化合物）、ステアリン酸マグネシウム、その他3成分

【その他】

●この薬の保管方法は？

- ・直射日光と湿気を避けて室温（1～30℃）で保管してください。
- ・子供の手の届かないところに保管してください。

●薬が残ってしまったら？

- ・絶対に他の人に渡してはいけません。
- ・余った場合は、処分の方法について薬局や医療機関に相談してください。

【この薬についてのお問い合わせ先は？】

- ・症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、主治医や薬剤師にお尋ねください。
- ・一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売会社：東和薬品株式会社 (<https://www.towayakuhin.co.jp/>)

販売会社：共創未来ファーマ株式会社 (<http://www.kyosomirai-p.co.jp>)

お客様相談室

電話：050-3383-3846

受付時間：9時～17時

（土、日、祝祭日、弊社休日を除く）