

イマチニブ錠100mg「KMP」 を服用される患者さまへ

大切な注意です。
お薬を服用する前に必ず
お読みください。



約200cc程度

- 胃への負担を減らし、吐き気などの消化器症状を抑えるため、食後に多め(200cc程度)の水またはぬるま湯で服用してください。
- 十分な効果を維持するためには、必ず毎日続けて服用することが大切です。自分の判断で服用を中止したり、服用量を変更しないでください。
- このお薬を服用中は、グレープフルーツジュースやセント・ジョーンズ・ワート(セイヨウオトギリソウ)含有食品と一緒に飲食しないでください。
- このお薬には、一緒に飲む際に注意すべきお薬があります。そのため、他のお薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師または薬剤師に相談してください。
- 服用後にめまい、眠気、目のかすみなどが起こることがありますので車の運転・危険を伴う機械の操作をする際は、注意してください。

服用中に次のような症状があらわれることがあります。
我慢せずに、ご担当の医師または薬剤師に相談してください。



出血



発熱



吐き気・嘔吐、
食欲低下、下痢



むくみ
(急激な体重増加)



皮膚の発赤・
かゆみ



筋肉のけいれん・
筋肉痛

医師の指示に従って、定期的に受診・検査を受けてください。
この他にも気になる症状があらわれたら、ご担当の医師や薬剤師に
相談してください。

医師又は薬剤師の連絡先