


# メマンチン塩酸塩錠/OD錠「KMP」 を服用されている患者さま、 およびご家族や介護者の方へ

## このおくすりについて

- アルツハイマー型認知症の症状の進行を遅らせるおくすりです。

このおくすりをのみはじめるときは、体を慣らすために、通常、次のように服用します。

### 服用スケジュール



- ◆メマンチンは1日1回20mgをのみ続けることで効果があるおくすりです。
- ◆おくすりの量を増やすのは症状が悪化したからではありません。
- ◆医師の指示に従って、決められた量をのみましょう。
- ◆効果を十分に得るために、のむ時間を決め、毎日その時間に規則正しくのむようにしましょう。
- ◆ご自分やご家族の判断でのむのをやめたり、おくすりの量を加減したりしないでください。

## OD錠を服用されている方へ

このおくすりは水なしでものむことができる口腔内崩壊錠(OD錠)です。

- 舌の上で唾液を含ませ軽くつぶしてから、唾液と一緒にのみ込んでください。
- 水なしでのむときは、寝たままではのまないでください。
- 普通のおくすりと同様に、水またはぬるま湯でのむこともできます。どちらのみ方でも効き目は変わりません。

裏面もご覧ください

## のみはじめの副作用にご注意ください。

- 眠くなったり、めまいなどが起こることがあります。

## おくすりをのみ忘れたら？

- 気がついたときに、できるだけ早く1回分をのんでください。ただし、次のむ時間が近い場合は1回とばして、次の時間に1回分をのんでください。2日分を一度にのんではいけません。

## おくすりを飲みすぎたら？

- 間違えてたくさん飲んでしまい、いつもと違う様子がみられた場合は、すぐに医師または薬剤師に相談してください。

## 服用にあたっての注意事項

- 用法・用量を間違わないように、おくすりは医療従事者やご家族、介護者が服用や保管を管理してください。

このほか、おくすりについて分からないことがある場合や  
気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師にご相談ください。

医師または薬剤師の連絡先