

# ミニトロ<sup>®</sup>テープ27mg を使用される方へ

先生の指示に従ってお使いください。

このテープは狭心症の薬です。

注意：この薬を貼る人は勃起不全治療剤（バイアグラ錠・レビトラ錠・シアリス錠および同効薬）を服用しないでください。


## 貼り方

1 貼る場所をあらかじめよく拭いて、水分や汗を十分取り除いてください。

2 包装の切り口を手で破り、薬を取り出してください。



透明フィルムのほうを上にして、二つに折ってください。



透明フィルムの片方をはがしてください。



そのまま、白色テープの部分を皮膚にぴったり貼ってください。



残った透明フィルムをはがしながら、白色テープをおさえるようにして残りの部分を貼ってください。

### 注意

- AEDパッド（裏面参照）の貼付部位の妨げにならないように注意してください。
- 新しい薬に貼りかえる時は、前回と同じ場所は避けてください。
- もし、かゆみやかぶれなどが出た時は、先生にご相談ください。

● メモ

---

---

---

---

---

● 病・医院名、薬局

---

---


---

---

---

# ミニトロ<sup>®</sup>テープ27mg を使用される方へ


先生の指示に従ってお使いください。



## このテープは 狭心症の薬です。

症状が良くなっても、先生から指示があるまで毎日きちんと貼りましょう。

### 貼る場所



## 貼る回数は1日1回(24時間ごと)です。


先生の指示に従って、AEDパッドの貼付部位(下図参照)の妨げにならないように胸部、腰部、上腕部のいずれかに貼ってください。

傷口、湿疹、炎症のみられる所には貼らないでください。

- 新しい薬に貼りかえる時は、前回と同じ場所は避けてください。
- もし、かゆみやかぶれなどが出た時は先生にご相談ください。

※貼りは裏面をご覧ください。

### 貼る場所に関するご注意



#### AEDパッドの貼付位置

AEDの電極パッドの貼付部位は、左図の様に『右鎖骨すぐ下』と『左脇下の肋骨最下部』の位置の2箇所になります。

※注意:本剤を胸部に貼る場合には、AEDの電極パッドの妨げにならないよう注意してください。