

# プロミペキロール塩酸塩錠「FFP」 を服用される患者さん及びご家族の方へ

このお薬を正しく服用するため、  
飲む前に必ずお読みください。

お薬は必ず**主治医の指示を守って**飲んでください。  
けっして自分の判断で飲む量を変えたり、飲むの  
をやめたりしないでください。

## 車の運転等はしないでください

このお薬を飲むと、眠くなったり、前ぶれもなく急に眠り込んでしまうこと、また、めまいや立ちくらみ、ふらつき、失神が起こることがあります。**車の運転や危険を伴う機械の操作、高い場所での作業などはしないでください。**

もしこのような症状があらわれた場合にはすぐに主治医または薬剤師に相談してください。



<裏面も必ずご覧ください>

次のような症状が起こった場合には、すぐに  
主治医または薬剤師に相談してください。

● 欲求や行動が抑えられなくなる (衝動制御障害)

このお薬はドパミン受容体作動薬と呼ばれるグループに属するお薬です。ドパミン受容体作動薬を飲むと、社会的に不利な結果を招くにもかかわらず、ギャンブルや過剰で無計画な買い物を持続的に繰り返したり、性欲や食欲が病的に亢進したりする『衝動制御障害 (病的賭博、病的性欲亢進、強迫性購買、暴食等)』が起こることがあります。



- 急な眠り込み、幻覚や妄想、めまいや立ちくらみ
- 発熱や意識がぼんやりした状態
- 筋肉のこわばりがひどい状態

この説明書に書いてあることは、特に注意していただきたいことです。このお薬について何か分からないことがありましたら、主治医または薬剤師に相談してください。

<表面も必ずご覧ください>

2013年8月改訂 002