

プラミペキソール塩酸塩LA錠0.375mgMI<sup>®</sup>オールラ

プラミペキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI<sup>®</sup>オールラ

を服用される患者さんにご家族の方へ

このお薬を正しく服用するため、  
飲む前に必ずお読みください。

必ず主治医の指示を守って飲んでください。  
決して自分の判断で飲む量を変えたり、  
飲むのを止めないでください。

自動車の運転等を行わないでください。

- このお薬を飲むと、  
眠くなったり、前ぶれもなく急に眠り  
込んでしまうこと(突発的睡眠)、  
また、めまいや立ちくらみ、  
ふらつき、失神  
が起ることがあります。



自動車の運転や危険を伴う機械の操作、高い場所  
での作業などを行わないでください。

● **欲求や行動を抑えられなくなること  
(衝動制御障害)**


このお薬はドパミン受容体作動薬と呼ばれるグループに属するお薬です。ドパミン受容体作動薬を飲むと、社会的に不利な結果を招くにもかかわらず、ギャンブルや過剰で無計画な買い物を持続的に繰り返したり、性欲や食欲が病的に亢進したりする衝動制御障害(病的賭博、病的性欲亢進、強迫性購買、暴食等)が起こることがあります。




- **急な眠り込み、幻覚や妄想、めまいや立ちくらみ**
- **発熱や意識がぼんやりした状態**
- **筋肉のこわばりがひどい状態**

**このような症状があらわれた場合には、  
すぐに医師または薬剤師に相談してください。**

この説明書に書いてあることは、特に注意して  
いただきたいことです。このお薬について何か  
分からないことがありましたら、主治医または  
薬剤師に相談してください。

 製造販売元  
**大原薬品工業株式会社**  
滋賀県甲賀市甲賀町鳥居野121-15

販売元  
 **共創未来ファーマ株式会社**  
東京都品川区広町1-4-4

(表面も必ずご覧ください)