

# リバストラミンテープ「KMP」の使い方


このお薬は、皮膚から吸収された有効成分によって、  
もの忘れなどの認知症の症状進行を遅らせる働きがあります。

医師の指示に従って正しく使用してください。

1日1回、貼り替えるお薬です。

## テープを貼る場所

- 右の図で示した、背中、上腕、胸のいずれか1カ所に貼ります。  
(正常な皮膚で、清潔で乾燥した体毛が少ない場所、密着した衣服を着用してもこすれない場所を選んで貼ってください。)
- あらかじめ乾いたタオルなどで貼る場所を拭いて、水分や汗をよく取り除いてください。
- 傷や湿疹・皮膚炎などがある場所には貼らないでください。
- 貼る場所にクリーム、ローション、パウダーなどを塗らないでください。



## 貼るときの注意

- 貼る場所は毎回変え、同じ場所に続けて貼らないでください。
- 一度に2枚以上を貼らないように、まず前回貼ったテープをはがしてから、新しいテープを貼ってください。
- 1日1回、ほぼ同じ時間(約24時間毎)に新しいテープに貼り替えてください。
- このお薬は、切って使うことはできません。


## テープの貼り方

### 1 包装袋から取り出す




内部のテープを傷つけないように、手またはハサミで包装袋を切り、テープを取り出してください。

### 2 日付を記入する



テープ表面に、貼る日にちをペン・ボールペンなどで記入してください。  
(衣服への色移りにご注意ください。)


### 3 透明フィルムを半分はがす



テープには透明フィルムがついています。粘着面に触れないように、透明フィルムの半分をはがしてください。


### 4 テープを貼る

粘着面を背中、上腕、胸のいずれかにあて、テープを貼ります。  
次に、残りの透明フィルムをはがしながら貼ってください。



### 5 テープを押さえる

テープがしっかりとくっつくまで手のひらで押さえてください。



# リバスチグミンテープ「KMP」を使うときの注意

## 貼り忘れたとき、はがれたときの注意

- 貼り忘れに気付いたときは、そのときに貼ってください。次からはいつもと同じ時間に貼り替えてください。貼り替えていないことに気付いた場合でも、一度に2回分を貼らないでください。
- 4日間以上貼っていない場合は、医師にご相談ください。
- はがれたときは、新しいお薬に貼り替え、次からはいつも同じ時間に貼り替えてください。

## 副作用に関する注意


- このお薬を開始したとき、または増量したときに、めまいや眠気がみられることがありますので、自動車の運転や危険な機械の操作はしないでください。
- 主な副作用として、お薬を貼った場所の皮膚症状(赤くなる、かゆみ、など)、嘔吐、恶心などが報告されています。気になる症状があらわれた場合は、医師または薬剤師にご相談ください。

## 保管上の注意

- 包装袋は貼る直前まで開けないでください。
- 子供やペットの届かないところに保管してください。
- 高温にならないところで保管してください。
- このお薬を家族や他の人にゆずってはいけません。

## テープを捨てるときの注意

- 皮膚を傷つけないよう、ゆっくりとやさしくはがしてください。
- はがしたテープは、まだお薬の成分が残っているので、接着面を内側にして半分に折りたたみ、子供やペットの届かないところに廃棄してください。
- テープをはがした手で目に触れないでください。
- テープをはがした後は、手を洗ってください。



テープイメージ (実物大) <small>※数字は有効成分の含有量を示します</small>	 4.5mg リバスチグミン 「KMP」 ( / )	 9mg リバスチグミン 「KMP」 ( / )	 13.5mg リバスチグミン 「KMP」 ( / )	 18mg リバスチグミン 「KMP」 ( / )
包装袋の色	桃色	だいだい色	黄緑色	紫色

このお薬について分からぬことがありますたら、担当の医師または薬剤師にご相談ください。