

# ロピニロール徐放錠2mg / 8mg「共創未来」 を服用される方とご家族の方へ

この薬を正しく服用するため、飲む前に必ずお読みください。

- この薬を飲むと、眠くなったり、前兆もなく急に眠り込んでしまうこととっばつてきすいみん(突発的睡眠)があります。

**自動車の運転、危険を伴う機械の操作、  
高いところでの作業などは避けてください**



## 突発的睡眠について

食事中や会話の最中などにも急に眠り込んでしまうことがあります。また、このような症状は、薬を飲み始めて1年以上経過してから見られる場合もあります。

- しょうどうせいぎよしょうがい衝動制御障害や、以下のようなことが起こったら、すぐに医師または薬剤師に連絡してください。
  - ・急激な眠りこみ
  - ・発熱や意識がぼんやりした状態
  - ・幻覚や妄想
  - ・筋肉のこわばりがひどい状態
  - ・めまいや立ちくらみ(ふらつき)

## びょうてきとぼく きょうはくせいこうばい ひょうてきせいよくこうしん ぼうしょく 衝動制御障害(病的賭博、強迫性購買、病的性欲亢進、暴食等)

社会的に不利な結果を招くにもかかわらず、ギャンブルや過剰で無計画な買い物や繰り返したり、病的に性欲や食欲が亢進したりすること。

- この薬はゆっくり溶け出し、長時間血中に留まるように設計されているので、割ったり砕いたりしないで、そのまま噛まずに飲んでください。
- 飲み方は、必ず医師の指示に従ってください。自分の判断で飲む量を変えたり、飲むのを止めたりしないでください。また、できるだけ毎日同じ時間帯にお飲みください。
- この他にも、気になることやわからないことがある場合は、医師または薬剤師に相談してください。