

あなたが飲むおくすりは スマトリプタン錠 50mg [FFP]です

このおくすりは、**片頭痛**のおくすりです。

錠 剤



服用量は**1回最大2錠**まで、**1日最大4錠**まで。

おくすりの飲み方と量

- 1回1錠飲んでください。
- 1回および1日の服用量は必ず医師または薬剤師の指示を守ってください。
- 片頭痛が始まったら早めにおくすりを飲んでください。
- 効果が不十分なときは、2時間以上の間隔をあけてもう1錠追加して飲むことができます。
- 1回1錠で効果が不十分だった場合、つぎの片頭痛発作時には1回2錠飲むことができます。

他のスマトリプタン製剤(注射薬・点鼻薬)を使用する場合

- このおくすりを服用後、他のスマトリプタン製剤の注射薬・点鼻薬を使用する場合は、2時間以上間隔をあけてください。
- スマトリプタン点鼻薬を使用後、このおくすりを服用する場合は2時間以上間隔をあけてください。
- スマトリプタン注射薬を使用後、このおくすりを服用する場合は1時間以上間隔をあけてください。

裏面もご覧下さい。

服用のタイミング

- 発作初期(痛み始め)の服用がもっとも効果的です。
 - ・このおくすりは片頭痛が始まれば、どのタイミングでも有効ですが、痛み始めに服用するのがもっとも効果的です。
少しの痛みでも我慢せずに飲んでください。
- 痛みの前兆の時に飲んでも効果はありません。痛み始めてから飲むようにしてください。
- アロディニア(異痛症)があらわれた後に飲んでも十分な効果が得られません。アロディニアが起こる前に飲んでください。
(アロディニア…片頭痛が始まってから約20分後に、刺激に対して非常に敏感になる現象。)

服用上の注意事項

- 心疾患やその他の病気をお持ちの方、他のおくすりを服用中の方は、医師に伝えてください。
- このおくすりを服用後、下記の様な症状が見られたら、服用を中止して医師に相談してください。
 - ・めまい、胸がドキドキする、胸の痛み、胸がしめつけられる感じ、胸が押しつぶされるような感じなど。
- その他、いつもと違う症状がおこったら、医師や薬剤師に相談してください。
- このおくすりは予防薬ではありません。必ず片頭痛が起きている時のみ飲んでください。
- このおくすりを服用後、眠くなることがありますので自動車の運転や危険を伴う機械操作はしないでください。