

タダラフィルOD錠ZA「トローワ」を 服用されている患者さまへ

この薬を安全に使用するため 飲む前に必ずお読みください

- 狭心症などの心臓の疾患に使われるニトログリセリンなどの硝酸薬や肺高血圧症に使われるリオシグアトとこの薬は併用できません。重篤な副作用を起こすことがあります。
- 医師の指示通りに飲んでください。決して自分で飲む量を増やしてはいけません。必ず1日1回の服用としてください。
- この薬を飲んだ後、次のような症状があれば、すぐに医師または薬剤師に相談してください。
 - 4時間以上勃起が続く
 - 目が見えにくい
 - 耳が聞こえにくい
- この薬は処方された患者さんのものです。決して他の人に譲り渡したりしないでください。
- その他、気になることや分からないことがある場合は、医師または薬剤師に相談してください。

この薬は水なしでも飲むことができる口腔内崩壊錠(OD錠)です。

- 舌の上で唾液を含ませ軽くつぶしてから、唾液と一緒に飲み込んでください。
- 水なしで飲むときは、寝たままで飲まないでください。
- 普通の薬と同様に、水またはぬるま湯で飲むこともできます。どちらの飲み方でも効き目は変わりません。

医師または薬剤師の連絡先

製造販売元

東和薬品株式会社

販売元

 共創未来ファーマ株式会社